


Leczenie autyzmu

**Instytut Studiów nad Szczytowymi
Stanami Świadomości (ISPS)**

dr Grant McFetridge
22-24 czerwca, 2018 r.

Prelegent: dr Grant McFertridge

- Założyciel i dyrektor badań w Instytucie Studiów nad Szczytowymi Stanami Świadomości
 - doktorat z psychologii klinicznej
 - od 1995 r. zajmuje się badaniami naukowymi w obszarze zdrowia
 - opracował technikę regresji uzdrawiania traum: Whole-Hearted Healing (Uzdrawianie Całym Sercem)
- Zaplecze naukowe z różnych dziedzin
 - inżynieria elektryczna, Uniwersytet Stanforda, 1984 r.
 - inżynier ds. Badań i Rozwoju przez ponad 25 lat
 - wykładał inżynierię elektryczną na Uniwersytecie Kalifornijskim



Institute for the Study of Peak States

- to mały instytut o charakterze międzynarodowym
- założony w latach 90-tych XX w.
- pierwotny cel – osiągnięcie stanu *Walking in Beauty* (Ścieżka Piękna)
- dokonał fundamentalnych odkryć w biologii i w psychologii
- udziela licencji terapeutom na stosowanie swoich technik
- w relacji z klientem stosuje zasadę „opłaty za rezultat”

Będziemy mówić o:

- historii badań nad autyzmem w Instytucie
- badaniu hipotez dotyczących szczepionek i uszkodzeń mózgu
- podejściu Instytutu do leczenia autystycznej „infekcji”
- przedwczesnych porodach
- zespole Aspergera
- stosowaniu innych metod terapeutycznych w leczeniu autyzmu

O zaangażowaniu ISPS w badania nad autyzmem zdecydował przypadek

- Nasze badania rozpoczęły się w 1998 r.
- Przyjaciel i współpracownik z Instytutu ISPS, Wes Gietz (na zdjęciu z prawej z dr Deolą Perry) miał autystycznego syna
- Autyzm rozpoczyna się w pierwszej fazie porodu



2000 rok – nasz pierwszy proces leczenia autyzmu

- Uzdrowienie epigenetycznych uszkodzeń w organizmie matki leczy autyzm u jej dziecka (uzdrawianie ojca nie ma wpływu na uzdrowienie autyzmu dziecka)
- W przeprowadzanych badaniach zastosowaliśmy specjalny rodzaj muzyki, frazy i zobrazowanie, które regresują matkę do przeżyć z jej porodu
- Zastosowaliśmy też dobrze znaną technikę opukiwania EFT (*Emotional Freedom Technique*) do uzdrowienia traumy narodzin matki
- Dr Deola Perry i ja opracowaliśmy nasz pierwszy proces leczenia autyzmu

Zmiany emocjonalne i rozwojowe – rezultaty pierwszego procesu leczenia autyzmu

- W 2000 r. przeprowadziliśmy pierwsze badania z udziałem pięciorga autystycznych dzieci – czworo z nich zostało skutecznie wyleczonych z autyzmu (matka jednego z dzieci przerwała program przed zakończeniem terapii)
- Po przeprowadzeniu procesu matki nagle odczuły więź emocjonalną z dziećmi, zaś dzieci nagle zaczęły odczuwać emocje i zapragnęły nawiązać więź z matkami
- W ciągu jednego roku dzieci przechodziły w przyspieszonym tempie fazy rozwojowe wczesnego dzieciństwa - z nauką mówienia włącznie

Linda Johnson – matka chłopca, który miał autyzm

[świadectwo Lindy Johnson \(video\)](#)

Błędne diagnozowanie autyzmu – przykład z Danii

- Wypróbowaliśmy nową metodę leczenia w Danii w 2008 r. na dziesięciorgu dzieciach ze zdiagnozowanym autyzmem
 - troje dzieci miało objawy autyzmu
 - pięcioro dzieci miało inne problemy
 - u dwojga dzieci nie rozpoznaliśmy żadnych problemów
- Kluczowe odkrycie – wiele dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem nie ma autyzmu
- Konsekwencja – chcemy leczenia metodą, która będzie obejmować wiele różnych zaburzeń u dzieci

Zespół Aspergera (AS)

- Zespół Aspergera to nie autyzm
- Osoba z zespołem Aspergera ma wrażenie bycia zamkniętą w szklanej probówce
- Niektórzy ludzie mają objawy zespołu Aspergera tylko w jednej połowie ciała, nie zdając sobie z tego sprawy
- Leczenie jest dość proste, a jego skutkiem jest eliminacja wrażenia szklanej ściany, co w konsekwencji prowadzi do wyeliminowania objawów zespołu Aspergera
- Ten proces oferujemy na zasadzie „opłaty za rezultat”

Hipoteza dotycząca uszkodzeń mózgu

- W 2008 r. zbadaliśmy hipotezę mówiącą, że urazowe uszkodzenia mózgu (TBI) wywołują autyzm
- Wyszliśmy do wniosku, że urazowe uszkodzenia mózgu (TBI) *nie* wywołują autyzmu
- Leczenie urazowych uszkodzeń mózgu może eliminować objawy u dzieci z błędnie zdiagnozowanym autyzmem
- Po skutecznym leczeniu autyzmu dziecko może również potrzebować uzdrowienia urazowego uszkodzenia mózgu
- Instytut ISPS oferuje leczenie urazowego uszkodzenia mózgu na zasadzie „opłaty za rezultat”


Hipoteza dotycząca szczepionek

- Szczepionki nie wywołują autyzmu
- Szczepionki zakażały dzieci głęboko autystyczne, jednak eliminacja zakażenia nie miała wpływu na objawy
- U dzieci, których *nie* szczepiono i tak rozwijał się ciężki autyzm

Odkrycie Komórki Prymarnej


- Komórka prymarna jest miejscem, w którym znajduje się świadomość człowieka
- Problemy związane z komórką prymarną są odczuwane jako doznania w ciele
- Komórka prymarna wyznacza wzorzec dla wszystkich pozostałych komórek w organizmie

The Primary Cell Model



Znalezienie klucza do zrozumienia autyzmu

- Linda Johnson stała się naszym kluczem do zrozumienia przyczyny autyzmu
- Jądro komórki prymarnej jest subkomórkowym odpowiednikiem mózgu – uszkodzenia w jądrze komórkowym (a szczególnie w jąderku) objawiają się dysfunkcją mózgu
- Ludzie, którzy regresują się do tego momentu „widzą” obraz ciała nałożony na obraz jądra komórkowego
- Szkic po prawej stronie przedstawia bakterię autyzmu, którą zobaczyła matka w trakcie regresji do momentu porodu



Etapy zakażenia autyzmem w trakcie porodu

1. Zarówno matka, jak i płód zostają zarażeni bakterią autyzmu
2. Początkowa faza porodu wywołuje u matki uczucie wściekłości i agresji związane z chęcią przetrwania
3. Bakteria autyzmu uszkodza jądro komórkowe u dziecka
4. Matka natychmiast zaczyna odczuwać płód dziecka jako „autystyczny”

„Widzenie” autyzmu w jąderku

- Dzięki określonej zdolności szczytowej można dostrzec „dziury” w mózgu u osoby z autyzmem
- Jest to obraz uszkodzenia jąderka
- U ludzi z ciężkim autyzmem brakuje dużej części materiału „mózgu”
- Te obserwacje pozwoliły nam przetestować nową metodę leczenia autyzmu
- Nasza metoda leczenia urazowego uszkodzenia mózgu nie daje możliwości wypełnienia brakujących części jąderka

Ataki

- Ataki padaczki powodowane są przez inną bakterię żyjącą w lukach (dziurach) powstałych w wyniku zakażenia autyzmem wewnątrz jąderka

Leczenie zakażenia autyzmem

- Terapia psychoimmunologiczna stosuje techniki podobne do psychologicznych, aby uodpornić daną osobę na patogen
- W 2018 r. odkryliśmy technikę psychologiczną, której celem jest uodpornienie matki na zakażenie autyzmem
- Epigenetyczne uszkodzenie, które wywołuje podatność na bakterię autyzmu, jest przenoszone przez kobiety
- Uodpornienie kobiety na bakterię autyzmu uodparnia również dziecko; natomiast uodpornienie ojca, nie uodparnia dziecka na bakterię autyzmu

Wściekłość i agresja matki w trakcie porodu

- Wyleczenie patogenu autyzmu nie wystarcza – musieliśmy również wyeliminować wściekłość i agresję matki w stosunku do dziecka w trakcie porodu
- Nasze pierwsze skuteczne terapie w 2000 r. polegały na wyeliminowaniu agresji matki w momencie porodu
- Wściekłość i agresja matki związane z chęcią przetrwania skierowane były przeciwko męskiej części u dziecka
- Źródłem agresji matki w czasie porodu jest moment zapłodnienia – pomiędzy komórką jajową (część żeńska) a plemnikiem (część męska)

Przedwczesne porody

- Przedwczesne porody są silnie skorelowane z autyzmem i innymi problemami u dzieci
- Zygota rodzica (w przyszłości – autystyczna matka) rozpoczyna wytwarzanie swoich pierwotnych komórek rozrodczych jeszcze przed całkowitą implantacją
- To powoduje traumę (uraz) bezdechu w nowo uformowanym organizmie i powoduje różnego rodzaju problemy i choroby



zygota
zagnieżdża się w
ściance macicy



zygota rozpoczyna
wytwarzanie
pierwotnych komórek
rozrodczych



zygota rozpoczyna
wytwarzanie
pierwotnych komórek
rozrodczych



zygota
zagnieżdża się w
ściance macicy

Konwencjonalne techniki medyczne

- Możliwe jest odkrycie badania krwi na patogen autyzmu
- Leczenie farmakologiczne może przynosić efekty w naprawianiu uszkodzeń spowodowanych autyzmem, ale z pewnością byłoby skuteczne, gdyby stosowano je u ciężarnych matek przed porodem.


Stosowanie innych metod terapeutycznych w leczeniu autyzmu

- Inne metody leczenia autyzmu są bardzo dobre
- Mogą one działać na inne choroby mieszczące się w kategorii autyzmu
- Mogą one stosować inne mechanizmy uzdrawiania autyzmu, które mogą być bardziej efektywne


Podsumowanie

- Autyzm wywołuje bakteria, która uszkadza jądro komórki prymarnej
- Terapia psychoimmunologiczna mająca na celu eliminację patogenu jest skuteczna
- U matki wywoływane jest nieuświadomione uczucie agresji podczas narodzin jej dziecka, co wywołuje u niego uszkodzenie związane z autyzmem
- Leczenie obejmujące wczesne wydarzenia rozwojowe eliminuje problem wystąpienia agresji u matki
- Zespół Aspergera jest zupełnie innym schorzeniem, niezwiązanym z autyzmem
- Dzieci z urazowymi uszkodzeniami mózgu mogą również być leczone w celu wyeliminowania symptomów uszkodzenia


Polecane lektury



Szczytowe stany
świadomości



Psychobiologia
subkomórkowa



Whole-Hearted
Healing (Uzdrowianie
Całym Sercem)

Pytania

